

EVOLUTIE ANTIBIOTICARESISTENTIE MASTITISPATHOGENEN

2025





Om een beeld te schetsen van de evolutie in de antibioticaresistentie van de mastitispathogenen bundelde MCC-Vlaanderen de gegevens van de gevoeligheidsbepalingen (antibiogrammen) van kalenderjaar 2025. We geven ook telkens een trendanalyse voor de jaren 2022-2023-2024-2025.



GRAMPOSITIEVE MASTITIS PATHOGENEN


Resistentiepatronen van Grampositieve bacteriën, namelijk *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae* en *Streptococcus agalactiae*, geïsoleerd uit melkmonsters afkomstig van klinische mastitis en subklinische mastitis (attentiekoeien).

Als de kritische antibiotica cefquinome en marbofloxacin intramammair worden toegediend, worden ze geclassificeerd onder de klasse B antibiotica ([E-formularium](#), [AMCRA](#)).






Staphylococcus aureus bij subklinische mastitis (n = 90)




Staphylococcus aureus geïsoleerd bij subklinische mastitis (2022-2025)






Streptococcus uberis bij klinische mastitis (n = 271)




Streptococcus uberis geïsoleerd bij klinische mastitis (2022-2025)






Streptococcus uberis bij subklinische mastitis (n = 100)




Streptococcus uberis geïsoleerd bij subklinische mastitis (2022-2025)






Streptococcus dysgalactiae bij klinische mastitis (n = 112)




Streptococcus dysgalactiae geïsoleerd bij klinische mastitis (2022-2025)






Streptococcus dysgalactiae bij subklinische mastitis (n = 57)




Streptococcus dysgalactiae geïsoleerd bij subklinische mastitis (2022-2025)






Streptococcus agalactiae bij klinische mastitis (n = 13)



Streptococcus agalactiae geïsoleerd bij klinische mastitis (2022-2025)



Streptococcus agalactiae geïsoleerd bij subklinische mastitis wordt niet weergegeven wegens te lage aantallen.




GRAMNEGATIEVE MASTITIS PATHOGENEN


Resistentiepatronen van Gramnegatieve bacteriën, namelijk *Escherichia coli*, *Klebsiella* species, *Serratia* species, *Pasteurella* species geïsoleerd uit melkmonsters afkomstig van klinische mastitis en subklinische mastitis (attentiekoeien).

Als de kritische antibiotica cefquinome en marbofloxacin intramammair worden toegediend, worden ze geclassificeerd onder de klasse B antibiotica ([E-formularium](#), [AMCRA](#)).

Escherichia coli bij klinische mastitis (n = 379)




Escherichia coli geïsoleerd bij klinische mastitis (2022-2025)






Escherichia coli bij subklinische mastitis (n = 53)




Escherichia coli geïsoleerd bij subklinische mastitis (2022-2025)






Klebsiella species bij klinische mastitis (n = 54)




Klebsiella species geïsoleerd bij klinische mastitis (2022-2025)






Klebsiella species bij subklinische mastitis
(n = 10)




Klebsiella species geïsoleerd bij subklinische mastitis
(2022-2025)






Serratia species bij klinische mastitis (n = 41)




Serratia species geïsoleerd bij klinische mastitis (2022-2025)






Serratia species bij subklinische mastitis (n = 14)




Serratia species geïsoleerd bij subklinische mastitis (2022-2025)





Pasteurella species bij klinische mastitis (n = 13)



Pasteurella species geïsoleerd bij klinische mastitis (2022-2025)

